

全国 2014 年 10 月高等教育自学考试

妇产科护理学(一)试题

课程代码:03002

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 25 小题,每小题 1 分,共 25 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 妊娠中期葡萄糖筛查试验,口服葡萄糖的剂量为
A. 25g
B. 50g
C. 75g
D. 100g
2. 女性生殖系统恶性肿瘤发生率最高的是
A. 子宫颈癌
B. 卵巢癌
C. 外阴癌
D. 子宫内膜癌
3. 最适宜阴道毛滴虫生长繁殖的阴道 pH 值为
A. 小于 5
B. 5.1~5.4
C. 5.5~6.0
D. 大于 7
4. 在实验室检查中,可提示为滋养细胞疾病的指标是
A. 白细胞计数
B. 绒毛膜促性腺激素
C. 黄体生成素
D. 雌激素
5. 口腔溃疡作为一种常见的化疗不良反应,其愈合多发生在停药后
A. 3 天
B. 1 周
C. 2 周
D. 3 周
6. 下列不属于卵巢功能测定的检查是
A. 基础体温测定
B. 宫颈粘液涂片检查
C. 阴道细胞学检查
D. 性交后试验

7. 关于化疗，下列叙述正确的是
- A. 当化疗药物外渗时常用利多卡因封闭
 - B. 一般情况下，血小板低于 $50 \times 10^9/L$ 即有自发性出血
 - C. 患者化疗过程中每天检测尿 pH 值应不小于 7.0
 - D. 阿霉素可引起心肌细胞的损伤
8. 功血治疗的首选方法是
- A. 刮宫
 - B. 药物治疗
 - C. 化疗
 - D. 手术治疗
9. 正常产褥期成熟乳的分泌开始时间大约为产后
- A. 3 天
 - B. 7 天
 - C. 10 天
 - D. 14 天
10. 关于子宫，下列叙述正确的是
- A. 成人宫体与宫颈的比例为 1:2
 - B. 宫体与宫颈之间最狭窄的部分为子宫峡部
 - C. 子宫峡部上端是组织学内口
 - D. 经产妇的子宫颈外口为圆形
11. 枕先露分娩，在放置产钳时，当胎头骨质部分已达坐骨棘下 3cm，矢状缝位于骨盆出口前后径上，胎头已拨露时可使用
- A. 高位产钳
 - B. 中位产钳
 - C. 低位产钳
 - D. 后出头产钳
12. 某女，32 岁，孕₁产₀，因“妊娠 35 周，阴道少量出血 4 小时”就诊，检查：血压 110/80mmHg，无腹痛，无宫缩，胎心 144 次/分，B 超结果提示部分性前置胎盘，此时可采取的处理方法为
- A. 阴道检查
 - B. 人工破膜
 - C. 期待疗法
 - D. 剖宫产术
13. 慢性子宫颈炎病理变化中，最常见的是
- A. 宫颈糜烂
 - B. 宫颈息肉
 - C. 宫颈肥大
 - D. 宫颈腺体囊肿
14. 输卵管由双侧宫角向外依次为
- A. 间质部、峡部、壶腹部、伞端
 - B. 伞端、峡部、间质部、壶腹部
 - C. 峡部、间质部、壶腹部、伞端
 - D. 壶腹部、峡部、间质部、伞端
15. 足月新生儿生理性黄疸持续的时间大约为
- A. 3 天
 - B. 1 周
 - C. 2 周
 - D. 3 周

16. 下列属于阴道后穹隆穿刺适应症的是
- A. 盆腔较大肿瘤
B. 盆腔内积液
C. 怀疑卵巢恶性肿瘤
D. 盆腔严重粘连
17. 关于妊娠合并心脏病，心功能 I ~ II 级的孕妇，分娩期正确的处理措施是
- A. 入院后开始使用抗生素
B. 阴道分娩时，应缩短第二产程
C. 第三产程后腹部压沙袋
D. 产后应在产房内观察 6 小时
18. 正常妊娠后，最早可在耻骨联合上扪及子宫底的时间是妊娠
- A. 6 周末
B. 8 周末
C. 10 周末
D. 12 周末
19. 宫内节育器的放置时间是
- A. 月经来潮前 3~7 天
B. 自然分娩后 1~2 周
C. 剖腹产术后 1 个月
D. 月经干净后 3~7 天
20. 妇科恶性肿瘤化疗中，最常见和最严重的不良反应是
- A. 造血功能障碍
B. 消化道反应
C. 肝肾功能障碍
D. 免疫抑制
21. 关于妇科阴式手术，下列叙述正确的是
- A. 术前一日上午用 1:40 络合碘溶液冲洗阴道
B. 术前一日开始放甲硝唑泡腾片至阴道内
C. 次全子宫切除术者需要在宫颈口涂甲紫
D. 子宫肌瘤剔除术者需要在阴道穹窿处涂甲紫
22. 下列不属于糖尿病产妇新生儿易发生的并发症是
- A. 坏死性小肠炎
B. 红细胞增多症
C. 高胆红素血症
D. 呼吸窘迫综合征
23. 胎头双顶径进入骨盆入口平面，胎头颅骨最低点接近或达到坐骨棘水平，称为
- A. 衔接
B. 下降
C. 俯屈
D. 复位
24. 某孕妇，28 岁，孕₁产₀，妊娠 38 周。产前检查时发现胎头未入盆，医生嘱孕妇进行 B 超检查以判断胎儿大小。超声检查应测量的胎头径线是
- A. 前后径
B. 枕额径
C. 双顶径
D. 枕下前凶径
25. 某绒癌患者，临床发现已有肺转移，化疗中最好的给药途径是
- A. 口服给药
B. 肌肉注射
C. 静脉给药
D. 腔内注射

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共 15 空, 每空 1 分, 共 15 分)

26. 按照子宫切口部位, 剖宫产术可分为四种, 目前应用最广泛的是_____剖宫产术。
27. 人工流产术后一般休息_____周。
28. 骨盆倾斜度一般为_____度, 若角度过大, 常影响胎头衔接。
29. 妊娠合并心脏病的妇女, 产后_____小时内易发生心力衰竭。
30. 阴道镜检查前_____小时内禁止阴道灌洗和上药。
31. 女性生殖器炎症患者, 在真菌感染时, 以_____菌为主。
32. 产褥感染是指在分娩与产褥期因_____创面受致病菌的感染, 所引起的局部或全身炎症的变化。
33. 化疗药物导致造血功能障碍时, 白细胞常在用药_____周左右开始下降。
34. 闭经的原因按病变部位分为下丘脑性闭经、垂体性闭经、卵巢性闭经和_____性闭经。
35. 早开奶时, 通过新生儿吸吮母亲的乳房, 可刺激母亲垂体前、后叶释放催乳素及_____。
36. 正常产妇产后胎盘附着部位的子宫内膜修复约需要_____周。
37. 宫颈癌最早的症状是_____。
38. 新生儿生理性黄疸的出现, 是由于出生后, 体内过剩的红细胞迅速破坏而产生大量的_____, 新生儿肝脏酶系统发育不完善, 不能在短期内使其排除的缘故。
39. 胎儿期卵圆孔位于左右_____之间, 多于出生后 6~8 周完全闭锁。
40. 自月经第一日起至下次月经第一日的时间间隔称为_____。

三、名词解释题(本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

41. 侵蚀性葡萄胎
42. 诊断性刮宫
43. 双合诊
44. 羊水过多
45. 产后出血

四、简答题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

46. 简述子宫收缩乏力常见的病因。
47. 简述中期妊娠利凡诺引产术后的护理内容。
48. 简述正常分娩产后健康教育的内容。
49. 简述第三产程后检查胎盘胎膜的方法与内容。
50. 简述子宫内膜异位症的临床表现。

五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

51. 赵女士，30 岁，孕₁产₀，以“妊娠 33 周，头痛头晕视物模糊 5 天”入院，查体：血压 190/120mmHg，脉搏 90 次/分，下肢水肿（++），尿蛋白（++），胎心 134 次/分。

根据以上资料，请回答：

- （1）该孕妇可能的医疗诊断。
 - （2）对此类患者的处理原则。
 - （3）对此类患者的护理措施。
52. 某女士，45 岁，卵巢癌根治术后第一天，患者一般状况可，各种管道引流畅。主诉伤口疼痛难忍。请写出缓解疼痛的护理措施。