

绝密 ★ 考试结束前

全国 2015 年 10 月高等教育自学考试

妇产科护理学(二)试题

课程代码:03010

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 宫颈癌患者最早出现的症状是
A. 阴道排液
B. 阴道流血
C. 白带恶臭
D. 疼痛
2. 某孕妇,孕 38 周,因下腹部剧烈疼痛 30 分钟急诊入院。查体:宫缩 2 分钟一次,持续 50~60 秒,子宫下段压痛明显,腹部有明显的环状凹陷,阴道无流血,胎心 110 次/分。该孕妇最可能的临床诊断是
A. 前置胎盘
B. 胎盘早剥
C. 先兆子宫破裂
D. 不完全性子宫破裂
3. 关于会阴湿热敷,下列描述正确的是
A. 湿热敷时间为 5~10 分钟
B. 湿热敷温度为 36~39℃
C. 湿热敷溶液为 25%硫酸镁
D. 湿热敷面积为病损范围 2 倍
4. 双胎妊娠阴道分娩时,通常第二胎娩出的时间在第一胎娩出后
A. 5 分钟之内
B. 15~20 分钟
C. 30~45 分钟
D. 60 分钟左右
5. 有关宫内节育器的避孕原理,正确的是
A. 抑制卵巢排卵
B. 干扰受精卵着床
C. 干扰下丘脑—垂体—卵巢轴
D. 阻止精子进入宫腔及输卵管

6. 最常见的外阴癌是
 - A. 基底细胞癌
 - B. 前庭大腺癌
 - C. 鳞状细胞癌
 - D. 恶性黑色素瘤
7. 导致胎盘粘连常见的原因是
 - A. 胎盘嵌顿
 - B. 子宫收缩乏力
 - C. 多次人工流产手术史
 - D. 胎盘绒毛植入子宫肌层
8. 羊水栓塞患者经抢救度过急性休克或出血期后, 最容易受损的器官是
 - A. 肺
 - B. 肝
 - C. 肾
 - D. 心脏
9. 某中年女性, 主诉外阴奇痒就诊。查体: 外阴皮肤发白, 未见其他异常。最可能的原因是
 - A. 细菌性阴道炎
 - B. 外阴疱疹病毒感染
 - C. 滴虫性阴道炎
 - D. 外阴鳞状上皮细胞增生
10. 在产前诊断中, 下列属于性连锁遗传病的是
 - A. 无脑儿
 - B. 红绿色盲
 - C. 肝豆状核变性
 - D. 先天卵巢发育不全症
11. 关于绒毛膜癌, 下列描述正确的是
 - A. 最常见的转移部位是阴道
 - B. 可继发于葡萄胎
 - C. 恶性程度低于侵蚀性葡萄胎
 - D. 病理可见变性绒毛结构
12. 胎儿生长受限最常见的因素是
 - A. 母亲因素
 - B. 胎儿因素
 - C. 胎盘及脐带因素
 - D. 子宫因素
13. 最常见的子宫内膜癌病理类型是
 - A. 腺癌伴鳞状上皮分化
 - B. 透明细胞癌
 - C. 浆液性腺癌
 - D. 内膜样腺癌
14. 羊水量过少是指
 - A. 妊娠中期羊水量少于 300ml
 - B. 妊娠中期羊水量少于 500ml
 - C. 妊娠晚期羊水量少于 300ml
 - D. 妊娠晚期羊水量少于 500ml
15. 子宫肌瘤在妊娠期间容易发生的变性是
 - A. 玻璃样变
 - B. 脂肪样变
 - C. 囊性变
 - D. 红色变

16. 关于胎膜早破, 下列描述正确的是
- A. 胎膜早破后应立即终止妊娠
 - B. 妊娠结局与破膜时孕周有关
 - C. 破膜后阴道液 PH 值为 4.5~5.5
 - D. 宫颈息肉是导致胎膜早破的主要原因
17. 某孕妇, 妊娠 37 周, 宫颈口开大 5cm 时突发脐带脱垂, 胎心率为 100 次/分, 下列处理措施中正确的是
- A. 肌肉注射杜冷丁 100mg
 - B. 抬高臀部并上推胎先露
 - C. 左侧卧位并监测胎心变化
 - D. 静脉点滴缩宫素加速产程进展
18. 负压吸引人工流产术中, 吸管进出宫颈管时应
- A. 降低负压
 - B. 关闭负压
 - C. 加大负压
 - D. 保持吸引时的负压
19. 下列与各种流产相对应的临床特点中, 正确的是
- A. 先兆流产表现为宫口未开、阴道流血量少于月经量
 - B. 不全流产表现为宫口未开、子宫大小与孕周相符
 - C. 完全流产表现为腹痛、阴道流血、宫口已开
 - D. 难免流产表现为阴道流血少、未破膜
20. 关于阴道镜检查的护理要点, 下列描述正确的是
- A. 术后 1 周复诊
 - B. 术后 4 周内禁止盆浴
 - C. 术后常规口服抗生素
 - D. 检查前 72 小时禁止性生活
21. 胎盘早期剥离的主要病理变化是
- A. 底蜕膜出血
 - B. 壁蜕膜出血
 - C. 包蜕膜出血
 - D. 真蜕膜出血
22. 某妇女患有阴道假丝酵母菌病, 需局部用药, 最适宜的药物是
- A. 甲紫
 - B. 新霉素
 - C. 氯霉素
 - D. 硝酸银
23. 诊断前置胎盘较安全可靠的方法是
- A. 阴道检查
 - B. 肛门检查
 - C. 放射线检查
 - D. B 型超声检查
24. 护士在为妇科腹部手术妇女进行术前护理时, 下列内容正确的是
- A. 为防止紧张情绪, 术日晨口服安定
 - B. 为防止恶心呕吐, 术日晨开始禁食
 - C. 为防止术中损伤膀胱, 术前留置导尿管
 - D. 为防止术后感染, 术前静脉点滴抗生素

25. 为孕妇进行糖筛查试验时，口服葡萄糖溶液的配制方法是
- A. 50 克葡萄糖粉溶于 200ml 水中 B. 50 克葡萄糖粉溶于 400ml 水中
C. 75 克葡萄糖粉溶于 200ml 水中 D. 75 克葡萄糖粉溶于 400ml 水中
26. 下列可导致出血性膀胱炎副作用的化疗药物是
- A. 甲氨蝶呤 B. 平阳霉素
C. 长春新碱 D. 环磷酰胺
27. 风湿性心脏病伴有肺动脉高压患者，妊娠 10 周出现急性心力衰竭，下列处理措施中正确的是
- A. 立即终止妊娠 B. 控制心衰后继续妊娠
C. 控制心衰后终止妊娠 D. 终止妊娠后控制心衰
28. 卵巢子宫内膜异位囊肿又称为
- A. 巧克力囊肿 B. 黄体囊肿
C. 滤泡囊肿 D. 畸胎瘤
29. 产前检查时，护士为某孕妇手测宫底高度在脐上 3 横指，此时该孕妇的孕周约是
- A. 妊娠 24 周末 B. 妊娠 28 周末
C. 妊娠 32 周末 D. 妊娠 36 周末
30. 关于子宫内膜不规则脱落的病因，下列描述正确的是
- A. 黄体发育良好，但萎缩过程延长
B. 排卵前雌激素分泌量不足，有排卵但黄体不健全
C. 卵泡期 FSH 的作用不足，影响卵泡发育，引起黄体轻度缺陷
D. 雌激素分泌量波动，不能形成排卵前高峰，卵泡虽有发育，但不排卵

二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

31. 在遗传咨询中，下列属于直系血亲的包括
- A. 堂兄妹 B. 祖父与孙女
C. 父亲与女儿 D. 同父异母的兄妹
E. 外祖父与外孙女

32. 引起子宫破裂的原因包括
- A. 胎盘早剥
 - B. 子宫手术史
 - C. 产科手术损伤
 - D. 缩宫素使用不当
 - E. 胎先露部下降受阻
33. 关于妇科腹腔镜术后的护理措施, 下列描述正确的是
- A. 术后 1 日进流食
 - B. 每日伤口换药
 - C. 每日擦洗外阴 2 次
 - D. 保持尿管和引流管通畅
 - E. 子宫肌瘤剔除术后 3 个月禁止性生活
34. 关于外阴鳞状上皮增生, 下列描述正确的是
- A. 患者忌食辛辣和过敏食物
 - B. 多见于 50 岁前的中年妇女
 - C. 主要症状为病损区皮肤发痒
 - D. 糖皮质激素局部涂擦为治疗首选
 - E. 患者应每日肥皂水擦洗外阴以保持清洁
35. 关于产褥感染的处理措施, 下列描述正确的是
- A. 根据药敏试验选用抗生素治疗
 - B. 外阴伤口感染可切开引流
 - C. 产后 5 天内可温水坐浴
 - D. 患者取左侧卧位休息
 - E. 高热患者可行物理降温

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

三、名词解释题(本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

- 36. 不孕症
- 37. 羊膜镜检查
- 38. 紧急避孕
- 39. 均小骨盆
- 40. 异位妊娠

四、简答题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

41. 简述宫颈癌患者出院指导内容。
42. 简述痛经妇女的护理措施。
43. 简述预防发生脐带异常的措施。
44. 简述妇科化疗患者腹痛腹泻的护理措施。
45. 简述子痫前期患者应用硫酸镁解痉治疗的注意事项。

五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

46. 某女，G₅P₂，既往体健，平素月经规律。主诉：停经 8 周，恶心、呕吐，伴不规则反复阴道流血 1 周，阴道排出物中见水泡状物入院。查体：阴道流血，子宫如孕 10 周大小，质软，双附件可扪及囊性肿物，鹅卵大小，活动度可。实验室检查：尿 HCG（+）。B 超：子宫增大，宫内未见孕囊，子宫区充满长形雪花状光片；双附件囊肿，大小 3×4cm。

根据以上资料，请回答：

- （1）该患者最可能的医疗诊断（2 分）。
- （2）该类患者的主要护理措施（8 分）。

47. 某女，28 岁，孕 39 周，G₁P₀，左枕前位。该妇女 10 年前诊断为糖尿病，一直采用胰岛素治疗，孕期血糖控制平稳。今晨自然临产入院，检查：宫缩 3~4 分钟一次，每次持续 30~40 秒，宫口开大 2cm，先露平棘，胎膜已破，胎心率 140 次/分，估计胎儿在 3000g 左右，无头盆不称。孕妇生命体征平稳。

根据以上资料，请回答：

- （1）该产妇阴道分娩过程中的护理措施（5 分）。
- （2）该类产妇的新生儿处理措施（5 分）。