

儿科护理学(二)试题

课程代码:03011

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 小儿前囟闭合的时间为生后

- | | |
|------------|------------|
| A. 4~6 周 | B. 2~3 月 |
| C. 1~1.5 岁 | D. 2~2.5 岁 |

2. 小儿头围与胸围大致相等的年龄为

- | | |
|---------|--------|
| A. 6 个月 | B. 1 岁 |
| C. 2 岁 | D. 6 岁 |

3. 小儿生长发育最为迅速的年龄期是

- | | |
|---------|--------|
| A. 婴儿期 | B. 幼儿期 |
| C. 学龄前期 | D. 学龄期 |

4. 适合 4 个月婴儿添加的辅食是

- | | |
|-------|-------|
| A. 面条 | B. 米糊 |
| C. 饼干 | D. 鱼泥 |

5. 儿童意外伤害死亡的首位死因是

- | | |
|---------|-------|
| A. 交通事故 | B. 中毒 |
| C. 异物窒息 | D. 跌落 |

6. 小儿患水痘时禁用的药物是

- | | |
|---------|------------|
| A. 干扰素 | B. 阿昔洛韦 |
| C. 苯巴比妥 | D. 肾上腺皮质激素 |

7. 胎龄 33 周早产儿生后 6 小时, 出现呼吸困难, 呈进行性加重, 伴呼气性呻吟, 三凹征明显, 有少量湿啰音, X 线胸片示肺野透亮度低, 并有细小斑点及网状阴影, 考虑该患儿可能为
- A. 吸入性肺炎
B. 新生儿窒息
C. 肺透明膜病
D. 充血性心力衰竭
8. 小儿肥胖是指体重超过同性别、同身高正常小儿体重均值的
- A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 30%
9. 人体内维生素 D 的主要来源是
- A. 皮肤光照合成
B. 植物性食物
C. 母体-胎儿的转运
D. 动物性食物
10. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症的小儿静脉推注钙剂注射时间不少于
- A. 1 分钟
B. 3 分钟
C. 5 分钟
D. 10 分钟
11. 营养不良患儿皮下脂肪消失的顺序为
- A. 腹部、面部、躯干、臀部、四肢
B. 腹部、躯干、臀部、四肢、面部
C. 四肢、躯干、臀部、腹部、面部
D. 面部、腹部、躯干、四肢、臀部
12. 小婴儿易出现呼吸节律不规则的主要原因是
- A. 呼吸功能储备能力差
B. 肺的容量小
C. 呼吸中枢发育不完善
D. 气道阻力大
13. 小儿轮状病毒肠炎好发的年龄段是
- A. 1~3 个月
B. 3~6 个月
C. 6~24 个月
D. 24~48 个月
14. 患儿, 10 个月, 腹泻 3 日, 每日大便 20 余次, 呈蛋花汤样, 给予补液、纠正酸中毒后, 患儿突然出现惊厥, 首先考虑为
- A. 低钙血症
B. 低钠血症
C. 低磷血症
D. 低钾血症
15. 1 岁小儿因食欲差、呕吐、腹胀、进食后啼哭、生长发育迟缓, 以“胃溃疡”收入院, 护士应特别注意观察患儿
- A. 大便颜色
B. 体温
C. 皮肤弹性
D. 尿量

16. 小儿最常见的先天性心脏病是www.jszikao.org

- A. 房间隔缺损
- B. 动脉导管未闭
- C. 室间隔缺损
- D. 肺动脉狭窄
17. 一法洛四联症婴儿哭闹后突然出现昏厥、抽搐，考虑其最有可能发生了
 - A. 缺氧发作
 - B. 窒息
 - C. 心力衰竭
 - D. 脑血栓
18. 右向左分流型先天性心脏病患儿发热时，尤其要注意
 - A. 供给充足营养
 - B. 保证休息
 - C. 供给充足液体
 - D. 给予吸氧
19. 10个月小儿，因面色发黄就诊，一直母乳喂养，未加辅食，诊断为营养性巨幼红细胞性贫血，应该给予的处理措施是
 - A. 输血
 - B. 补充维生素C
 - C. 口服铁剂
 - D. 补充维生素B₁₂、叶酸
20. 导致特发性血小板减少性紫癜患儿出血的主要原因是
 - A. 血小板功能异常
 - B. 毛细血管脆性增加
 - C. 血小板数量减少
 - D. 毛细血管通透性增加
21. 不属于新生儿特殊生理现象的是
 - A. 假月经
 - B. 生理性黄疸
 - C. 乳腺肿大
 - D. 生理性流涎
22. 幼年特发性关节炎的护理叙述不正确的是
 - A. 绝对卧床休息
 - B. 采用热敷方法缓解关节疼痛
 - C. 密切监测体温
 - D. 尽早开始关节的功能锻炼
23. 不符合先天性甲状腺功能减低症患儿主要临床特征的是
 - A. 智力低下
 - B. 生长发育落后
 - C. 肌张力高
 - D. 基础代谢率低
24. 临床可见到“帕氏征”的小儿传染病是
 - A. 麻疹
 - B. 猩红热
 - C. 水痘
 - D. 流行性腮腺炎
25. 麻疹患儿最常见的死亡原因是
 - A. 喉炎
 - B. 肺炎
 - C. 脑炎
 - D. 心肌炎

26. 符合水痘特点的是

- A. 消化道传播
- B. 1 岁以内小儿多见
- C. 潜伏期 1~7 日
- D. 皮疹呈向心性分布

27. 小儿结核病死亡的主要原因是

- A. 干酪性肺炎
- B. 粟粒性肺结核
- C. 结核性胸膜炎
- D. 结核性脑膜炎

28. 麻疹传染性最强的时期是

- A. 潜伏期
- B. 前驱期
- C. 出疹期
- D. 恢复期

29. 小儿结核病主要的传染途径是

- A. 皮肤外伤
- B. 饮用未经消毒的病牛的奶
- C. 垂直传播
- D. 吸入病人排出的带菌飞沫

30. 判断小儿心跳呼吸骤停的依据不包括

- A. 意识丧失
- B. 脉搏消失
- C. 瞳孔缩小
- D. 血压测不出

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题（本大题共 10 空，每空 1 分，共 10 分）

- 31. 我国新生儿疾病筛查主要包括_____、_____和葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺陷病等。
- 32. 6 个月至 2 岁半的婴幼儿，与父母分开表现出来的哭闹、攻击、悲伤等行为特征，称之为_____。
- 33. 当母亲血型为_____型，胎儿为 A 型或 B 型时，容易发生新生儿溶血病。
- 34. 肥胖症可发生在任何年龄的小儿，但_____岁以下、5~6 岁以及_____期最为常见。
- 35. 小儿腹泻病是由多病原、多因素引起的以大便次数增多和_____为特点的一组消化道综合征。
- 36. 幼年特发性关节炎全身型又称 Still 病，_____和_____是此型的主要特征。
- 37. 心跳呼吸骤停时心脏复苏成功的标志之一是口唇、甲床颜色_____。

三、名词解释题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

- 38. 幼儿期
- 39. 儿童意外伤害
- 40. 大于胎龄儿
- 41. 低渗性脱水
- 42. 维生素 D 缺乏性佝偻病

四、简答题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

- 43. 简述母乳喂养的断奶原则。
- 44. 简述影响儿童适应住院的因素。
- 45. 简述癫痫患儿药物治疗的护理措施。
- 46. 简述原发性肾病综合征患儿水肿的护理要点。
- 47. 简述糖尿病患儿预防低血糖发生的措施。

五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

- 48. 患儿女，10 个月，纯母乳喂养，未添加辅食，近两个月来面色苍白、精神差，以“贫血待查”收入院。查体：T 36.8℃，P 140 次/分，精神萎靡，面色、口唇苍白。血常规：Hb 96g/L，RBC $3.1 \times 10^{12}/L$ ；镜下见红细胞大小不等，以小细胞为多，中央淡染区扩大，诊断为营养性缺铁性贫血。

请根据以上资料回答：

- （1）该患儿的贫血程度。
- （2）请为该患儿家长做喂养指导。
- （3）该患儿需服用铁剂进行治疗，请简述口服铁剂的注意事项。

- 49. 婴儿，6 个月，发热、喘憋 1 天，以肺炎收入院。体格检查：T 38.1℃，R 82 次/分；烦躁不安，口唇发绀；心率 186 次/分，心音低钝；满肺可闻及哮鸣音，喘憋缓解时可闻及少许中、细湿啰音；肝脏右肋下 3cm。

请根据以上资料回答：

- （1）该患儿出现了何种并发症并写出依据。
- （2）写出针对此并发症的主要护理措施。