

绝密 ★ 考试结束前

全国 2016 年 10 月高等教育自学考试

外科护理学(一)试题

课程代码:03001

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 属于伤口感染外源性易感因素的是

- | | |
|------------|---------------|
| A. 机体抗病能力弱 | B. 切口部位选择不当 |
| C. 空气中含细菌 | D. 手术过程中止血不彻底 |

2. 术前要求患者禁食水的目的是

- | | |
|-------------|-----------|
| A. 避免术中污染术野 | B. 减轻术后腹胀 |
| C. 避免术中血糖上升 | D. 防止术中呕吐 |

3. 甲状腺大部切除术的手术切口属于

- | | |
|------------|-----------|
| A. I 类切口 | B. II 类切口 |
| C. III 类切口 | D. 难以分类切口 |

4. 对细胞外液的增减起主导作用的细胞外液的离子是

- | | |
|------------------|---------------------|
| A. Na^+ | B. K^+ |
| C. Cl^- | D. HCO_3^- |

5. 经抗休克处理后,提示微循环改善的最重要指标是

- | | |
|---------|-------|
| A. 尿量 | B. 血压 |
| C. 肢端温度 | D. 心率 |

6. 反映内脏蛋白质贮备的指标是
 - A. 体重
 - B. 上臂肌围
 - C. 氮平衡
 - D. 白蛋白
7. 全麻过程中, 导致下呼吸道梗阻的原因是
 - A. 舌后坠
 - B. 气管导管扭转
 - C. 喉头水肿
 - D. 口腔分泌物多
8. 男性, 40 岁, 右下肢被开水烫伤, 局部剧痛, 布满大水疱, 部分水疱基底外露, 呈鲜红色, 该病人烫伤深度为
 - A. I 度
 - B. 浅 II 度
 - C. 深 II 度
 - D. III 度
9. 判断甲亢严重程度最重要的临床表现是
 - A. 睡眠状况
 - B. 甲状腺大小
 - C. 脉率和脉压
 - D. 突眼程度
10. 有关乳腺癌改良根治术, 术前皮肤准备范围的描述正确的是
 - A. 上至胸骨柄
 - B. 下至脐水平
 - C. 前至健侧腋前线
 - D. 后过肩胛线
11. 最容易发生嵌顿的腹外疝是
 - A. 腹股沟斜疝
 - B. 腹股沟直疝
 - C. 切口疝
 - D. 股疝
12. 原发性腹膜炎与继发性腹膜炎最主要的区别是
 - A. 有无腹膜刺激征
 - B. 腹痛的性质
 - C. 腹腔有无原发病灶
 - D. 全身感染程度
13. 胃大部切除术后最早出现的并发症是
 - A. 术后胃出血
 - B. 吻合口梗阻
 - C. 吻合口瘘
 - D. 倾倒综合征
14. 不完全性肠梗阻患者不会出现的临床表现是
 - A. 腹痛
 - B. 呕吐
 - C. 腹胀
 - D. 停止自肛门排气排便
15. 男性, 56 岁, 原发性肝癌, 拟行肝叶切除术, 术前医嘱用酸性液灌肠, 其目的是
 - A. 减轻局部刺激
 - B. 减少灌肠液的量
 - C. 预防代谢性碱中毒
 - D. 减少肠道氨的吸收
16. 在我国引起急性胰腺炎最常见的病因是
 - A. 胆道疾病
 - B. 过量饮酒
 - C. 暴饮暴食
 - D. 高脂血症
17. 男性, 50 岁, 血栓闭塞性脉管炎患者, 患肢皮肤苍白, 麻木, 行走一段路后, 感小腿疼痛, 需止步休息, 休息后疼痛缓解可再行走。患者 Fontaine 分期是
 - A. I 期
 - B. II 期
 - C. III 期
 - D. IV 期

18. 颅内压增高的患者头痛特点是
- A. 晨、晚较轻
B. 多在额部和颞部
C. 多为隐痛
D. 头低位时可减轻
19. 颅脑损伤患者最适宜的体位是
- A. 平卧位
B. 床头抬高 15° - 30°
C. 俯卧位
D. 头低脚高位
20. 诊断肋骨骨折最可靠的方法是
- A. 外伤病史
B. 局部压痛
C. 胸部 X 线检查
D. 胸廓挤压试验
21. 全肺切除术后放置胸腔闭式引流的目的是
- A. 引流积气、积液
B. 调压作用
C. 便于观察病情
D. 减少出血
22. 诊断食管癌最可靠方法是
- A. X 线钡餐检查
B. 食管脱落细胞学检查
C. CT 检查
D. 食管纤维镜检查
23. 判断胸腔闭式引流管是否通畅的最主要方法是
- A. 观察有无气体、液体引出
B. 观察长玻璃管中水柱有无波动
C. 询问患者有无胸闷气促
D. 观察呼吸频率
24. 尿三杯试检中, 若第一杯尿液异常, 提示病变在
- A. 前尿道
B. 后尿道
C. 膀胱颈部
D. 肾脏
25. 膀胱严重感染患者出现的尿失禁类型是
- A. 真性尿失禁
B. 假性尿失禁
C. 压力性尿失禁
D. 急迫性尿失禁
26. 膀胱癌最常见的致病因素是
- A. 寒冷
B. 吸烟
C. 感染
D. 经常憋尿
27. 骨科患者肢体长期制动后常可引起的并发症是
- A. 废用性肌萎缩
B. 神经损伤
C. 压疮
D. 感觉异常
28. 急性血源性骨髓炎最早发生的部位是
- A. 短管骨干骺端
B. 扁平骨
C. 关节骨骺
D. 长管骨干骺端
29. 肩关节脱位特有体征是
- A. 疼痛
B. 肘外展过度
C. 搭肩试验阳性
D. 银叉畸形
30. 属于潜在恶性的骨肿瘤是
- A. 骨软骨瘤
B. 骨肉瘤
C. 巨细胞瘤
D. 尤文肉瘤

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共 10 小题, 每空 1 分, 共 20 分)

31. 休克指数计算是_____, 用于判断休克轻重; 指数 >2.0 说明为_____。
32. 正常血清钾浓度是_____mmol/L; 低钾血症最早出现的表现是_____。
33. 引流液一般借助于_____和_____原理, 通过引流物缓慢排出体外。
34. 急性血源性骨髓炎的好发部位是_____, 常见的致病菌是_____。
35. 骨折按照移位情况可分为_____和_____。
36. 血栓闭塞性脉管炎好发于下肢远端血管, 病变呈_____性, 具有_____发作的特点。
37. 急性胰腺炎病人禁食、胃肠减压的目的是减轻_____, 防止_____, 使胰腺得到休息。
38. 胆绞痛为右上腹突发阵发性绞痛, 疼痛常向_____和_____放射。
39. 直肠肛管周围脓肿多数起自_____感染, 其中_____脓肿临床上最常见。
40. 肠梗阻确诊时, 极为重要的是辨别是否出现_____, 一旦出现, 需立即_____治疗。

三、名词解释(本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

41. Cushing 综合征
42. 腹膜刺激征
43. 反常性酸性尿
44. 烧伤
45. 肠梗阻

四、简答题(本大题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分)

46. 简述物理灭菌的常用方法。
47. 男性, 60 岁, 因肺癌行肺叶切除术, 术后安置胸腔闭式引流, 请说出该病人拔管的护理要点。
48. 简述回肠膀胱术后造口的护理方法。

五、病例分析题(本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

49. 女性, 35 岁, 因甲状腺功能亢进治疗效果欠佳, 近日住院行甲状腺大部切除术。术后第 1 天, 出现烦躁、呕吐, $T39.5^{\circ}\text{C}$, $P135$ 次/分。患者神情紧张, 抓住家人的手不放。请问: (1) 患者术后可能出现的并发症是什么?
(2) 列出患者此时 2 个主要的护理诊断/问题。
(3) 此时的护理要点是什么?
50. 男性, 42 岁, 曾 2 次以“肝硬化; 食管下段、胃底曲张静脉破裂出血”急诊入院。经非手术治疗出血停止。现病人一般情况较好, 为行脾腔静脉分流术收入病房。请问: (1) 病人术后可能出现哪些并发症?
(2) 应如何预防?